



- Szerokie spektrum bójcze
- Wiele możliwości zastosowania
- Bardzo dobra tolerancja
- Możliwość stosowania u noworodków i niemowląt

SOFTASEPT® N

SOFTASEPT® N

Alkoholowy preparat do dezynfekcji skóry przed operacjami i zabiegami.



WŁAŚCIWOŚCI

- Czas działania: 15 sekund. Przy zabiegu typu nakłucie stawu lub jamy ciała zawierającej płyn – czas działania 1 minuta.
- Nie stosować urządzeń elektrycznych, np. elektrod na skórę wilgotną.
- Możliwość stosowania na skórę noworodków i niemowląt
- Wysoka aktywność również w sytuacji obciążenia biologicznego, czyli w obecności krwi, białka, surowicy
- Szybkoschnący
- Wersja barwiona do zaznaczenia pola operacyjnego
- Bardzo dobrze tolerowany przez skórę, przebadany dermatologicznie, brak dodatkowych substancji minimalizuje ryzyko wystąpienia podrażnień i reakcji alergicznych

Dostępne opakowania	Numer katalogowy	
Softasept® N bezbarwny		
butelka o poj. 250 ml z atomizerem	pak 4 poz 2	18334
butelka o pojemności 1000 ml	pak 4 poz 1	18335
kanister o pojemności 5 L		18336
atomizer do butelki o poj. 1000 ml		3908012
Softasept® N zabarwiony		
butelka o poj. 250 ml z atomizerem		18337
butelka o pojemności 1000 ml	pak 1 poz 1	18338
atomizer do butelki o poj. 1000 ml		3908012

Softasept® N – skład

100 g zawiera: 78,83 g etanolu (96%), 10,0g 2-propanolu, wodę oczyszczoną. W wersji barwionej dodatkowo: azorubina, żółcień pomarańczowa.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun Straße 1, D-34212 Melsungen , Niemcy

ZASTOSOWANIE

- Przedoperacyjna dezynfekcja skóry.
- Dezynfekcja i zaznaczanie pola operacyjnego – wersja Softasept N barwiony
- Dezynfekcja skóry przed
 - biopsjami,
 - punkcjami,
 - pobieraniem krwi,
 - zastrzykami,
 - cewnikowaniem żył
 - szczepieniami
- Do zastosowania wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny. Produktu leczniczego nie należy rozcieńczać. Nierozcieńczony preparat Softasept N niezabarwiony nanieść na skórę i rozprowadzić jałowym gazikiem. Odkazaną powierzchnię skóry należy dokładnie zwilżyć produktem, a następnie pozostawić do wyschnięcia. Nadmiar produktu zebrać wacikiem.
- Czas działania: 15 sekund. Przy zabiegu typu nakłucie stawu lub jamy ciała zawierającej płyn – czas działania 1 minuta.
- Nie stosować urządzeń elektrycznych, np. elektrod na skórę wilgotną.

SKUTECZNOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA

Bakterie (w tym Tbc), grzyby	15 s
Wirusy otoczkowe (HCV, HBV, HIV, Vacina)	15 s
Rotawirus	60 s
Poliowirus	5 min

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na etanol, 2-propanol, lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych. Nie stosować leku doustnie.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Lek łatwopalny. Pojemnik powinien być szczelnie zamknięty. Okres ważności w nienaruszonym opakowaniu 5 lat, po pierwszym otwarciu opakowania 12 miesięcy (nie dłużej niż okres ważności podany na etykiecie)

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Softasept N barwiony
Świadectwo Rejestracji nr 11413/M/99

Softasept N bezbarwny
Świadectwo Rejestracji nr 111656/M/99